

Prot. n°5/C/2023

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 9 Gennaio 2023

OGGETTO: **Emergenza COVID-19 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti.**

Informiamo le Imprese aderenti che, il Ministero della Salute, con la Circolare 51961 del 31/12/2022 (**in allegato alla presente**), ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di casi COVID-19, in relazione al regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza.

**ISOLAMENTO PER LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AD UN TEST DIAGNOSTICO MOLECOLARE O ANTIGENICO PER SARS-CoV-2**

Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Per coloro che avranno terminato l'isolamento senza l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo, è obbligatorio l'uso di DPI (tipo FFP2) fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo, ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Il provvedimento in oggetto non fornisce alcuna considerazione in merito alla necessità o meno di un test antigenico o molecolare negativo per il rientro al lavoro, per il quale ci riserviamo di segnalare ulteriori approfondimenti non appena disponibili.

**AUTOSORVEGLIANZA PER LE PERSONE CHE HANNO AVUTO UN CONTATTO  
STRETTO CON SOGGETTI CONFERMATI POSITIVI AL SARS-COV-2**

Il regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è stato ridotto da 10 a 5 giorni dall'ultimo contatto stretto, durante i quali è obbligatorio indossare DPI di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Cordialità

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

